



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, B.P. 67128, 35067 RENNES CEDEX, ☎ 99 36 01 74

Publication périodique


BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN n° 202

10 janvier 1990




Le Tomato Spotted Wilt Virus

1- Caractéristiques générales du virus

- * **Répartition:** mondiale (Europe, Asie, Amérique, Australie,...).
- * **Transmission:** par *Frankliniella occidentalis* et *Thrips tabaci*, insectes très polyphages et ubiquistes. La transmission par graine et par voie mécanique est rare ou inconnue.
- * **Hôtes:** très nombreux (200 espèces appartenant à 30 familles)
- * **Symptômes:** très variables, ils portent souvent à confusion. L'analyse en laboratoire est indispensable pour confirmer le diagnostic visuel.
 - **Feuilles/tiges:** nanisme; marbrures, mosaïques, décolorations et taches en anneau pouvant évoluer en nécroses; feuilles bronzées; nervures proéminentes, éclaircies;...
 - **Fruits:** taches et déformations.

Dans la plupart des cas, les rendements sont nuls ou très réduits et la qualité très altérée.

2- Cycle d'infestation par le vecteur *Frankliniella occidentalis*



Remarque: les thrips sont très attirés par les fleurs et les jeunes tissus tendres et turgescents.

P25

3- Conseils pour limiter les risques de contamination par le T.S.W.V.

En priorité:

Dans une serre sans T.S.W.V., les thrips ne peuvent acquérir et transmettre le virus. Une contamination ne peut débuter qu'à partir de l'introduction dans la serre de plantes et/ou de thrips contaminés. En conséquence:

- * au moindre doute sur l'état sanitaire des plants introduits, isoler le lot suspect, avertir le S.R.P.V. et faire réaliser une analyse (cf paragraphe 6).
- * surveiller l'introduction de thrips et l'évolution des populations présentes dans les serres; traiter avec énergie à la moindre alerte (Cf paragraphe 5).
- * rechercher en permanence tout symptôme suspect (non habituel).

Pour plus de sécurité:

Appliquez les mesures préventives préconisées dans les paragraphes 4 et 5 suivants, au moins en partie, en fonction de vos possibilités et contraintes, et du niveau de risque d'introduction de la maladie dans votre exploitation.

4- Conseils pour enrayer une attaque de T.S.W.V. et éviter une recontamination

Important:

Ne pas hésiter à contacter le SRPV pour l'adaptation des mesures préconisées.

Agir sur le virus:

- * détruire par le feu les plantes avec symptômes et leurs voisines; la simple taille des parties malades ne suffit pas, le virus étant systémique et les thrips contaminés pouvant être présents sur l'ensemble de la plante.
- * repérer leur emplacement pour faciliter le suivi ultérieur.
- * maintenir une surveillance constante pour assainir en permanence.

Agir sur les thrips:

- * Conduire une lutte sévère et immédiate contre tous les stades des thrips: oeufs, larves et adultes (Cf paragraphe 5).
- * Autres conseils:
 - avant de brûler des plantes malades, les traiter pour limiter la fuite des thrips adultes
 - traiter les nouveaux plants avant leur introduction.

Autres mesures:

- * Tenir la serre et les abords constamment propres et désherbés.
- * Nettoyer les plans de travail extérieurs.
- * Détruire les reliquats de culture, ne jamais les entasser, même loin des serres.

5- La lutte contre les thrips

Elle sera d'autant plus rigoureuse que l'introduction de plantes extérieures à l'établissement est fréquente et surtout que la serre ou les environs ont déjà connu une contamination par le T.S.W.V.

Principes de base de la lutte:

* Une détection très précoce:

une élimination précoce est beaucoup plus facile et limite en outre les risques de contamination et de dissémination du virus.

Moyens: - plaques jaunes engluées

- frappage sur un échantillon de fleurs de cultures sensibles
- dans certains cas et avec beaucoup de prudence, mise en place dans les cultures à surveiller, de quelques potées fleuries très attractives; les adultes attirés seront facilement observés et détruits ensuite (plantes utilisables: Gloxinia, Saint-Paulia, Hibiscus splendens).

* Des traitements réguliers:

- traitements d'assurance: une application insecticide par semaine
- en cas d'introduction de thrips, d'augmentation de la population ou de présence de plantes très sensibles: série de 3 traitements espacés de 3 à 5 jours (intervalle maximum).